


1.4 LOGARITHMES

cours 4


De la même manière que



De la même manière que

$$12 \div 3$$


donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12



De la même manière que

$$12 \div 3$$


donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12



De la même manière que

$$12 \div 3$$


donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12



De la même manière que

$$12 \div 3$$


donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12



De la même manière que

$$12 \div 3$$


donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12



De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12




De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16$$

donne le nombre de bonds de $\times 2$ nécessaire pour atteindre 16




De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16$$

donne le nombre de bonds de $\times 2$ nécessaire pour atteindre 16




De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de +3 nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16$$

donne le nombre de bonds de x 2 nécessaire pour atteindre 16




De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de $+3$ nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16$$

donne le nombre de bonds de $\times 2$ nécessaire pour atteindre 16




De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de +3 nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16$$

donne le nombre de bonds de x 2 nécessaire pour atteindre 16




De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$

donne le nombre de bonds de +3 nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16 = 4$$

donne le nombre de bonds de x 2 nécessaire pour atteindre 16



De la même manière que


$$12 \div 3 = 4$$

$$3 \times 4 = 12$$

donne le nombre de bonds de +3 nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16 = 4$$

donne le nombre de bonds de x 2 nécessaire pour atteindre 16



De la même manière que

$$12 \div 3 = 4$$


$$3 \times 4 = 12$$

donne le nombre de bonds de +3 nécessaire pour atteindre 12

$$\log_2 16 = 4$$

$$2^4 = 16$$

donne le nombre de bonds de x 2 nécessaire pour atteindre 16



Logarithme

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3$$

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{car}$$

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{car} \quad 2^3 = 8$$

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{car} \quad 2^3 = 8$$

Notation:

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{car} \quad 2^3 = 8$$

Notation:

$$\log_{10} a = \log a$$

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{car} \quad 2^3 = 8$$

Notation:

$$\log_{10} a = \log a$$

$$\log_e a = \ln a$$

Logarithme

On définit $\log_a b$ comme l'inverse de l'exposant.

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

Exemple

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{car} \quad 2^3 = 8$$

Notation:

$$\log_{10} a = \log a$$

$$\log_e a = \ln a$$

$$e = 2,718281828459 \dots$$

Faites les exercices suivants

23, 24 et 25.

Propriétés des logarithmes

rechercher des références

Propriétés des logarithmes

1. $\log_a 1 = 0$

Propriétés des logarithmes

1. $\log_a 1 = 0$

Justification:

Propriétés des logarithmes

1. $\log_a 1 = 0$

Justification: $a^0 = 1$

Propriétés des logarithmes

1. $\log_a 1 = 0$

Justification: $a^0 = 1$

2. $\log_a a = 1$

Propriétés des logarithmes

1. $\log_a 1 = 0$

Justification: $a^0 = 1$

2. $\log_a a = 1$

Justification:

Propriétés des logarithmes

1. $\log_a 1 = 0$

Justification: $a^0 = 1$

2. $\log_a a = 1$

Justification: $a^1 = a$

3. $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$

3. $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$

Justification:

3. $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$

Justification:

$$\log_a(bc) = n$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$n = m + r$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$\log_2(4 \times 8)$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

$$2^5 = 32$$

$$3. \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Justification:

$$\log_a(bc) = n \iff a^n = bc$$

$$\log_a b = m \iff a^m = b$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$n = m + r$$

$$a^n = bc = a^m a^r = a^{m+r}$$

Exemple

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

$$2^5 = 32 = 4 \times 8$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$

$$a^m = b^n = (a^r)^n$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Exemple

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Exemple

$$\log_2(8^3)$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Exemple

$$\log_2(8^3) = 3 \log_2(8)$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Exemple

$$\log_2(8^3) = 3 \log_2(8) = 3 \times 3$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Example

$$\log_2(8^3) = 3 \log_2(8) = 3 \times 3 = 9$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Example

$$\log_2(8^3) = 3 \log_2(8) = 3 \times 3 = 9$$

$$2^9 = 2^{3 \times 3}$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Example

$$\log_2(8^3) = 3 \log_2(8) = 3 \times 3 = 9$$

$$2^9 = 2^{3 \times 3} = (2^3)^3$$

$$4. \log_a(b^n) = n \log_a b$$

Justification:

$$\log_a(b^n) = m \iff a^m = b^n$$

$$\log_a(b) = r \iff a^r = b$$

$$m = nr$$
$$a^m = b^n = (a^r)^n = a^{nr}$$

Example

$$\log_2(8^3) = 3 \log_2(8) = 3 \times 3 = 9$$

$$2^9 = 2^{3 \times 3} = (2^3)^3 = (8)^3$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

5. $\log_a b \log_b c = \log_a c$

Justification:

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$a^r = c$$

$$r = nm$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$
$$r = nm$$

Exemple

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_8 64 = 2$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_8 64 = 2$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_8 64 = 2$$

$$5. \log_a b \log_b c = \log_a c$$

Justification:

$$\log_a b = n \iff a^n = b$$

$$\log_b c = m \iff b^m = c$$

$$\log_a c = r \iff a^r = c$$

$$r = nm$$

$$a^r = c = b^m = (a^n)^m = a^{nm}$$

Exemple

$$\log_2 8 \times \log_8 64 = \log_2 64 = 6$$

$$2^6 = 64 = 8^2 = (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_8 64 = 2$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9$$

$$27 = 3^3$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12$$

$$144 = 12^2$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81 = \log_3 81$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81 = \log_3 81 = 4$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81 = \log_3 81 = 4$$

$$3^4 = 81$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81 = \log_3 81 = 4$$

$$3^4 = 81 = 12^{\log_{12} 81}$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81 = \log_3 81 = 4$$

$$3^4 = 81 = 12^{\log_{12} 81} = (3^{\log_3 12})^{\log_{12} 81}$$

Remarque:

Cette propriété des logarithmes peut sembler magique, car elle permet de calculer le produit de deux nombres sans pour autant être capable de les connaître.

$$\log_3 12 = ?$$

$$3^2 = 9 < 12 < 27 = 3^3$$

$$2 < \log_3 12 < 3$$

$$\log_{12} 81 = ?$$

$$12^1 = 12 < 81 < 144 = 12^2$$

$$1 < \log_{12} 81 < 2$$

$$\log_3 12 \times \log_{12} 81 = \log_3 81 = 4$$

$$3^4 = 81 = 12^{\log_{12} 81} = (3^{\log_3 12})^{\log_{12} 81} = 3^{\log_3 12 \times \log_{12} 81}$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\log_c a \times \log_a b}{\log_c a} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\log_c a \times \log_a b}{\log_c a} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\log_c a \times \log_a b}{\log_c a} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre c n'apparaît que d'un côté.

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Exemple

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Exemple

$$\log_8 32$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Exemple

$$\log_8 32 = \frac{\log_2 32}{\log_2 8}$$

Formule de changement de base

La dernière propriété que l'on vient de voir peut être modifiée légèrement comme suit:

$$\log_c a \times \log_a b = \log_c b$$

$$\frac{\cancel{\log_c a} \times \log_a b}{\cancel{\log_c a}} = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Cette égalité a la particularité que le nombre **c** n'apparaît que d'un côté.

Exemple

$$\log_8 32 = \frac{\log_2 32}{\log_2 8} = \frac{5}{3}$$

Formule de changement de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Formule de changement de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Dans les faits on n'est pratiquement jamais en mesure d'évaluer un logarithme à la main.

Formule de changement de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Dans les faits on n'est pratiquement jamais en mesure d'évaluer un logarithme à la main.

À l'époque on utilisait des tables, mais de nos jours on utilise une calculatrice.

Formule de changement de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Dans les faits on n'est pratiquement jamais en mesure d'évaluer un logarithme à la main.

À l'époque on utilisait des tables, mais de nos jours on utilise une calculatrice.

Par contre les calculatrices ne donnent que les logarithmes en base 10 ou e .

Formule de changement de base

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Dans les faits on n'est pratiquement jamais en mesure d'évaluer un logarithme à la main.

À l'époque on utilisait des tables, mais de nos jours on utilise une calculatrice.

Par contre les calculatrices ne donnent que les logarithmes en base 10 ou e .

La formule de changement de base nous permet donc d'évaluer avec la calculatrice n'importe quel logarithme dans n'importe quelle base.

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$$\log_3 7 = a$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$$\log_3 7 = a \quad \text{qu'on ne connaît pas}$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$\log_3 7 = a$ qu'on ne connaît pas

mais on sait que $3^a = 7$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$\log_3 7 = a$ qu'on ne connaît pas

mais on sait que $3^a = 7$

$$3^{\log_3 7}$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$\log_3 7 = a$ qu'on ne connaît pas

mais on sait que $3^a = 7$

$$3^{\log_3 7} = 3^a$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$\log_3 7 = a$ qu'on ne connaît pas

mais on sait que $3^a = 7$

$$3^{\log_3 7} = 3^a$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$\log_3 7 = a$ qu'on ne connaît pas

mais on sait que $3^a = 7$

$$3^{\log_3 7} = 3^a = 7$$

Que vaut $3^{\log_3 7}$?

Cette question semble difficile, car on a tendance à vouloir commencer par évaluer

$$\log_3 7$$

Mais on ne peut pas faire ça sans la calculatrice!

$\log_3 7 = a$ qu'on ne connaît pas

mais on sait que $3^a = 7$

$$3^{\log_3 7} = 3^a = 7$$

En général on a

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

mais ça se déduit bien des propriétés.

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

mais ça se déduit bien des propriétés.

$$\log_a a^b = b \log_a a$$

En général on a


$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

mais ça se déduit bien des propriétés.


$$\log_a a^b = b \log_a a$$

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

mais ça se déduit bien des propriétés.


$$\log_a a^b = b \log_a a = b \times 1$$

En général on a


$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

mais ça se déduit bien des propriétés.


$$\log_a a^b = b \log_a a = b \times 1$$

En général on a

$$a^{\log_a b} = b$$

En fait, cette propriété illustre le fait que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation.

Dans le même ordre d'idée, on a aussi

$$\log_a a^b = b$$

mais ça se déduit bien des propriétés.

$$\log_a a^b = b \log_a a = b \times 1 = b$$

Faites les exercices suivants

#26 à 29.

Devoir:

#23 à 29

p379 # 1 à 3

p388 # 3